

Merkblatt Nr. 3: Spritz- oder Sprühbehandlung

In Ihrem Objekt werden Inspektions- u. Bekämpfungsmaßnahmen zur Kontrolle eines Insektenbefalls von unseren Service-Technikern durchgeführt.

Um eine optimale Durchführung der Maßnahme und deren Erfolg sicherzustellen, sind folgende Hinweise zu beachten:

Vor der Behandlung

- ✓ Bereiche/ Räume zugänglich und begehbar machen
- ✓ Verkleidungen von nicht zugänglichen Maschinen, Schaltkästen, Thekenverkleidungen, usw., sowie nur mit Fachkunde zugängliche Bereiche sind durch Auftraggeber zu öffnen
- ✓ Entfernung von Nahrungsmittelresten / Abfälle auch an schwer erreichbaren Stellen (unter Schränken, Regalen, in u. unter Maschinen etc.), um den Insekten Nahrungsmöglichkeiten zu nehmen. Die Räume sollten möglichst staub- u. fettfrei sein
- ✓ Befallene Ware aussortieren und aus dem Gebäude entfernen
- ✓ Sollten im Vorfeld Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt worden sein, müssen die Präparatrückstände vom Auftraggeber entfernt werden, da diese sonst den Erfolg einschränken können, oder es in seltenen Fällen zu unvorhersehbaren chemischen Reaktionen kommen kann
- ✓ Offene, nicht sicher verpackte Lebensmittel, Arbeitsgeräte, Geschirr, empfindliche Gegenstände etc. (Bedarfs- / Gebrauchsgegenstände) müssen aus den Räumen entfernt, abgedeckt (Folie verwenden) oder in dicht schließenden Schränken aufbewahrt werden. Lebensmittel, Arbeitsgeräte usw. sind vorher auf Befall zu kontrollieren
- ✓ Tiere müssen aus dem Behandlungsbereich entfernt werden. Aquarien/ Terrarien müssen entfernt oder mittelsicher vom Auftraggeber geeignet abgesichert werden

Während der Behandlung

- ✓ Aufenthalt von Personen o. Haustieren im Anwendungsbereich ist nicht gestattet
- ✓ Die gesamten Wartezeiten sind gemäß der Service-Quittung einzuhalten

Nach der Behandlung

- ✓ Die behandelten Räume für 2 - 6 Stunden geschlossen halten - nicht betreten!
Im Anschluss für mindestens 1 Stunden durchlüften (querlüften) oder Lüftungsanlage mit maximaler Leistung betreiben
- ✓ Alle nicht abgedeckten Arbeitsgeräte oder Flächen, die mit Lebensmittel in Berührung kommen, sind nach der Behandlung mit einem alkalischen Haushaltsreiniger zu reinigen. Die Hinweise aus den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten
- ✓ Behandelte Zielflächen (Schlupfwinkel von Insekten) sollten anschließend, wenn überhaupt, nur grob gereinigt werden, damit die ausgebrachten Präparate nicht entfernt werden

- ✓ Führen Sie keine Eigenanwendungen mit Insektensprays durch
- ✓ Belassen Sie Monitorfallen, auch die mit Befallsspuren an ihrem Standort
- ✓ Tote u. alte Insekten entfernen, um eine aktuelle Befallskontrolle zu ermöglichen
- ✓ Bauliche Mängel, die dem Unterschlupf von Insekten dienen können, sind erst nach Tilgung des Hauptbefalls zu beseitigen

Gefährdung bei insektiziden Spritz- oder Sprühmaßnahmen

Die eingesetzten Präparate sind in ihrer Wirkungsweise auf die Biologie der Insekten abgestimmt und werden je nach Sensibilität der zu behandelnden Bereiche ausgewählt.

Die Nichteinhaltung der Sicherheitsmaßnahmen kann zu gesundheitlichen Risiken führen. Insbesondere das vorzeitige Betreten der Objekte, ungenügende Lüftung oder Reinigungsmaßnahmen, der Kontakt mit frischen Wirkstoffbelägen sowie das Einatmen oder Verschlucken von insektiziden Präparaten kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

Sollten wider Erwarten gesundheitliche Beschwerden auftreten, wenden Sie sich bitte mit Angabe der verwendeten Wirkstoffe (s. Service-Quittung/ Service-Dokumentation) an einen Arzt oder die **Giftinformationszentrale (0551-19240)**, um eine mögliche Gesundheitsgefährdung beurteilen zu lassen. Weitere Informationen sind im jeweiligen **Sicherheitsdatenblatt** enthalten.